

CEBULA

(Allium cepa var. cepa)

Cebula zwyczajna - Zawiera dużo soli mineralnych i witamin A, B₁, B₂, C, E, PP. Działa na organizm odkwaszająco, przeciwcukrzycowo i leczniczo na serce. Olejki zawarte w cebuli hamują rozwój niepożądanych w organizmie bakterii. Cebula wymaga gleby łatwo nagrzewającej się, żyznej, próchnicznej o pH 5,8 - 6,5, nie toleruje gleb zakwaszonych. Jest wrażliwa na niedobór potasu i wapnia. Uprawiamy ją w pierwszym lub drugim roku po oborniku. Zaprawione nasiona wysiewamy wiosną wprost do gruntu, na głębokość 2 cm, lub zimą do inspektu przy uprawie z rozsady. Optymalna temperatura kiełkowania 18-20°C, a po wschodach 10-12°C. Zabiegi pielęgnacyjne: nawadnianie w czasie suszy, nawożenie, ochrona przed chwastami i chorobami. Ilość nasion w 1g: 150-400 szt.

Przy uprawie cebuli z dymki cebulki wysadzamy 1-10 kwietnia. Zbiór jest przyśpieszony o 2-3 tygodnie w stosunku do uprawy cebuli z siewu i przypada na lipiec przy uprawie cebuli z kl. I i II a na maj-czerwiec przy uprawie z cebul w kl. III. W zależności od kalibrażu dymki wysadzamy na 1ha od 300 do 1500 kg.

Cebula dymka kl. I (ø 5-10 mm) wysadzamy na 1ha/300-400 kg

Cebula dymka kl. II (ø 11-16 mm) wysadzamy na 1ha/600-700 kg

Cebula dymka kl. III (ø 17-25 mm) wysadzamy na 1ha/1300-1500 kg

SIEW : poł II - poł. III, 1-15 IV.

ZBIÓR : kon. VII-X.

ROZSTAWA : 3-5 x 30-45 cm.

NAWOŻENIE na 1ar : 0,8-1,2kg N, 1-1,5kg P₂O₅, 1,5-2,0 K₂O.

CHOROBY WIRUSOWE : żółta karłowatość, żółtaczka astra.

CHOROBY GRZYBOWE : mączniak rzekomy, głownia cebuli, biała zgnilizna cebuli, alternarioza, antraknoza.

SZKODNIKI : śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka, poskrzypka cebulowa, chowacz szczypiorek, udnica cebulówka, niszczyk zjadliwy.